



viverosmarianosoria

VARIETADES DE ALMENDRO

**AVIJOR | GUARA | VIALFAS® | SOLETA®
ISABELONA® | ANTOÑETA® | PENTACEBAS®
MARTA® | TARDONA® | MAKAKO®
INDEPENDENCE® ALM21**

CAMPAÑA 2021/2022



AVIJOR

- Autógama.
- Árbol de porte erecto.
- Vigor medio-alto similar a Ferragnes.
- Ramificación media, muy fácil poda.
- Fructificación sobre todo en ramilletes de mayo, ramos mixtos y madera joven.
- Época de floración: tardía (3-4 días después de Guara.)
- Época de maduración: media.
- Cáscara semidura.
- Rendimiento cáscara-pepita: 35-38%. Frutos dobles: menos del 5%. Peso medio pepita: 1.2gr



Otras observaciones:

Muy buena adaptación a secano, tolerante a enfermedades criptogámicas y cierta resistencia al frío. Rápida entrada en producción. Producción bastante regular.



GUARA

- **OBTENTOR: CITA**
- Autógama.
- Árbol de porte abierto, con tendencia al arqueado de las ramas por el peso.
- Ramificación bastante abundante los tres primeros años (necesita de buena poda de formación), luego pierde un poco de ramificación al entrar en producción.
- Fructificación en la mitad superior de ramos mixtos y preferentemente sobre ramilletes de mayo.
- Época de de floración: tardía.
- Época de maduración: temprana (final de Agosto)
- Cáscara dura.
- Rendimiento cáscara-
pepita: 32-35%. Frutos
dobles: 10-12%. Peso
medio pepita: 1.58gr



Otras observaciones:

Cierta resistencia a las heladas, floración abundante. Sensible a mancha ocre.





VIALFAS ®

- **OBTENTOR:** CITA
- Autocompatible
- **Árbol de porte** ligeramente erecto, aunque el peso de la producción inclina las ramas.
- **Época de floración:** tardía.
- **Época de maduración:** temprana (Aproximadamente +1 semana Guara)
- **Cáscara dura** (sin separarse en capas)
- **Rendimiento cáscara-pepita:** 25%. **Peso medio de la pepita:** 1.2gr.



Otras observaciones:

Las hojas muestran gran tolerancia a enfermedades fúngicas. En relación a la composición de la pepita, los contenidos en proteína, aceite, tocoferoles y fitoesteroles son de tipo medio. El contenido en ácido oleico es muy alto. Alto nivel de autogamia y cuajado de flores. Altamente tolerante a heladas.



SOLETA ®

- **OBTENTOR: CITA**
- Autógama (aunque puede polinizarse con otras variedades de la misma época de floración).
- Árbol de porte semi abierto. Vigor medio. Buen equilibrio entre producción y desarrollo vegetativo.
- Fructificación sobre todo en ramilletes de mayo y menos en ramos mixtos. Elevada densidad de floración.
- Época de floración: tardía. Época de maduración: media-tardía.
- Cáscara dura (sin separarse en capas).
- Rendimiento cáscara- pepita: 27-35%. Frutos dobles: 0.1%. Peso medio pepita: 1.27gr.



Otras observaciones:

Cierta sensibilidad a mancha ocre. Poda de formación y fructificación sencilla. Baja caída de frutos antes de recolección.





ISABELONA ®

- **OBTENTOR: CITA**
- Autógama. (Aunque puede polinizarse con variedades de la misma época de floración)
- Árbol de porte semi abierto. Vigor medio. Buen equilibrio entre y desarrollo vegetativo, por lo que las necesidades en poda de fructificación son bajas.
- Fructificación sobre todo en ramilletes de mayo y menos en ramos mixtos.
- Destaca su muy elevado contenido en aceite y en ácido oléico, así como en antioxidantes, especialmente tocoferoles, lo que la convierte en una de las variedades de mayor calidad.
- Elevada densidad de floración.
- Época de floración: tardía.
- Fecha de maduración: media.
- Cáscara dura (sin separarse en capas)
- Rendimiento pepita: 27-35%. Frutos dobles: 0.1%.
Peso medio pepita: 1.3gr



Otras observaciones:

La poda de formación es sencilla, la de fructificación requiere de rejuvenecimiento. Tolerante a mancha ocre. Tolerante a heladas.



ANTOÑETA ®

- **OBTENTOR:** CEBAS-CSIC
- Autógama
- Árbol de porte abierto. Vigor elevado. Ramificación abundante. Productividad elevada.
- Época de floración: tardía (Junto con Ferragnés)
- Época de maduración: muy temprana.
- Cáscara dura, muy fácil de recolectar.
- Rendimiento cáscara pepita: 35%. No presenta frutos dobles. Peso medio del fruto: 1.5g.



Otras observaciones:

Es una de las variedades de almendro de maduración más temprana. Buen comportamiento frente a heladas tardías. Bastante resistente a enfermedades criptogámicas. Nula caída de frutos antes de recolección.





PENTACEBAS ®

- **OBTENTOR: CEBAS-CSIC**
- Autógama.
- Árbol de porte intermedio, vigor intermedio y ramificación equilibrada. Fructifica sobre ramos mixtos y brindillas.
- Época de floración: extra-tardía.
- Época de maduración: temprana.
- Cáscara dura.
- Rendimiento cáscara-pepita 30%. No presenta frutos dobles. Peso medio del fruto: 1.0g



Otras observaciones:

Muy fácil la recolección . Rápida entrada en producción. No presenta caída prematura de frutos. Es bastante resistente a las principales enfermedades criptogámicas.



MARTA ®

- **OBTENTOR:** CEBAS–CSIC
- Autógama
- Árbol de porte erecto, aunque no excesivamente cerrado, vigor elevado y ramificación equilibrada.
- Época de floración: tardía
- Época de maduración: temprana.
- Cáscara dura.
- Rendimiento cáscara-pepita 32%. No presenta frutos dobles. Peso medio del fruto: 1.2g



Otras observaciones:

Muy fácil recolección. No presenta caída prematura de frutos. Es bastante resistente a las principales enfermedades criptogámicas que afectan al almendro.





TARDONA ®

- **OBTENTOR:** CEBAS–CSIC
- Autógama.
- Árbol de porte semi-abierto, vigor medio y ramificación abundante
- Época de floración: super-extra-tardía.
- Época de maduración: tardía.
- Cáscara dura.
- Forma de la almendra: redondeada.
- Rendimiento cáscara-pepita 25%. No presenta frutos dobles. Peso medio del fruto: 0.8 g



Otras observaciones:

Buena facilidad para recolección, No presenta caída de frutos maduros, cierta resistencia a enfermedades.



MAKAKO ®

- **OBTENTOR:** CEBAS-CSIC
- Autógama.
- Árbol de porte semi-erecto, vigor elevado y ramificación equilibrada
- Época de floración: extra-tardía.
- Época de maduración: temprana.
- Cáscara dura.
- Forma de la almendra: elíptica.
- Rendimiento cáscara-pepita 33%. No presenta frutos dobles. Peso medio del fruto: 1.2g



Otras observaciones:

Buena facilidad para recolección, no presenta caída de frutos maduros, buena resistencia a enfermedades.






INDEPENDENCE ® ALM21

- **OBTENTOR: ZAIGER GENETICS. EDITOR: I.P.S.**
- Autógama.
- Árbol de porte vertical, moderadamente vigoroso, con abundante floración.
- Época de floración: tardía
- Época de maduración: temprana.
- Cáscara blanda.
- Almendra grande, de alta calidad, color claro y sabor dulce.
- Rendimiento cáscara-pepita: 50% Peso medio del fruto: 1.2 gr



Otras observaciones:

Variedad temprana de gran producción que requiere un único pase para la recolección.



Cuadro de floración



Cuadro de maduración

